

Eurartesim® (artenimol/piperaquine) 320/40 mg

Fiche à destination du patient

Si < 75 kg → 3 comprimés

Si > 75 kg → 4 comprimés

en 1 prise pendant 3 jours consécutifs à jeun (minimum 3 heures après un repas et 3 heures avant le suivant) :

- ☐ 1^{ère} prise le ... / ... / à ... h ...
- ☐ 2^{ème} prise le ... / ... / à ... h ...
- ☐ 3^{ème} prise le ... / ... / à ... h ...

Mode d'emploi

- Prendre les comprimés par la bouche avec un verre d'eau
- L'Eurartesim® peut être coupé en deux ou écrasé et mélangé avec de l'eau
- Ne consommer aucun aliment pendant les 3 heures suivant la prise d'une dose

Suivi médical

- N'interrompez pas le traitement et ne changez pas la dose prescrite sans avis médical
- Un suivi médical clinique et une prise de sang doivent être réalisés au J3-5 et au J10-15 après le diagnostic de crise de malaria. Si cela n'a pas été prévu par le médecin responsable durant le diagnostic, prenez contact avec votre médecin traitant pour assurer ce suivi

Interactions

L'Eurartesim® peut interagir avec de nombreuses molécules :

- Inducteurs ou inhibiteurs du cytochrome CYP3A4 → Rifampicine (Rifadine®), phénytoïne (Diphantoïne®) et carbamazépine (Tegretol®), certains antimycosiques
- Anticoagulants de type antivitamine K comme l'acénocoumarol (Sintrom®) → Perturbation des taux d'acénocoumarol, un suivi d'INR doit être envisagé
- Inhibiteurs de protéase (traitement antirétroviral HIV) → Augmentation des taux de piperaquine
- Cette liste est non-exhaustive, ne débutez pas de nouveau médicament, complément alimentaire ou thérapie végétale sans en parler à votre médecin

En cas d'oubli

- Si vous avez oublié de prendre le comprimé à la bonne heure, prenez-le dès que possible et revenez sur l'heure habituelle le lendemain
- En cas d'oubli, ne prenez pas deux doses pour compenser la dose oubliée
- Signalez les oublis à votre médecin lors de la prochaine consultation

Précautions

- **Disponibilité** → Il est impératif de ne pas stopper ou retarder votre traitement par manque de disponibilité du médicament. En cas d'impossibilité d'accès en officine externe, il est recommandé de se présenter aux urgences pour garantir la prise adéquate du traitement.
- **Conduction électrique du cœur** → En cas de traitement par Eurartesim®, un électrocardiogramme doit impérativement être réalisé
- **Maux de tête** → Fréquents et réversibles, un traitement symptomatique est possible (ex : paracétamol). En cas de dégradation progressive des douleurs, une réévaluation médicale est conseillée.
- **Nausées** → Si celles-ci sont peu invalidantes, un traitement, soumis à prescription, par alizapride (Litican®) ou métoclopramide (Primpéran®) peut aider. En cas de vomissement empêchant la prise du traitement, il est recommandé de se présenter aux urgences pour poursuivre le traitement sous le couvert d'anti-nausée en intra-veineux.
- **Diarrhées**
 - Si 1-3 selles liquides par jour, non-glaireuses non-sanglantes → Effet secondaire classique, limitez les aliments gras ou épicés, hydratez-vous abondamment, éventuellement lopéramide (Imodium®)
 - Si > 3 selles liquides par jour ou sang/glaire retrouvés dans les selles → Ne prenez pas de lopéramide (Imodium®), consultez votre médecin afin de réaliser une analyse de selle
- **Fatigue importante** → Fréquente, due à l'infection mais également au traitement, réversible rapidement après la fin de la cure

En cas de vomissement

- Jusqu'à 30 minutes après la prise → Reprendre une dose complète
- Entre 30 et 60 minutes après la prise → Reprendre une demi-dose
- > 60 minutes après la prise → Ne pas reprendre de dose