

Primaquine 15 mg

Fiche à destination du patient

0,5mg/kg → ... mg (maximum 30 mg)
1 fois par jour avec repas gras ou boisson lactée
pendant 14 jours

Mode d'emploi

- Prenez les comprimés par la bouche avec un verre d'eau
- Il est toujours préférable de prendre les comprimés en entier.

Suivi médical

- En cas de déficit génétique en G6PD (enzyme qui protège les globules rouges), votre médecin prescripteur vous demandera de réaliser régulièrement des prises de sang pour exclure une anémie (taux de globules rouges trop bas)

Interactions

La primaquine n'a que peu d'interactions. On note uniquement les médicaments oxydants comme le sulfaméthoxazole (Bactrim®), la dapsone ou la chloroquine.

En cas de vomissement

- Jusqu'à 1 heure après la prise → Reprendre une dose
- > 1 heure après la prise → Ne pas reprendre de dose

Précautions

- **Disponibilité** → Il est impératif de ne pas stopper ou retarder votre traitement par manque de disponibilité du médicament. En cas d'impossibilité d'accès en officine externe, il est recommandé de se présenter aux urgences pour garantir la prise adéquate du traitement.
- **Nausées** → Si celles-ci sont peu invalidantes, un traitement, soumis à prescription, par alizapride (Litican®), métoclopramide (Primpéran®) ou dompéridone (Motilium®) peut aider. En cas de vomissement empêchant la prise du traitement, il est recommandé de contacter le médecin prescripteur pour rediscuter de la balance risque/bénéfice du traitement.
- **Diarrhées**
 - Si 1-3 selles liquides par jour, non-glaireuses non-sanglantes → Effet secondaire classique, limitez les aliments gras ou épicés, hydratez-vous abondamment, éventuellement lopéramide (Imodium®)
 - Si > 3 selles liquides par jour ou sang/glaire retrouvés dans les selles → Ne prenez pas de lopéramide (Imodium®), consultez votre médecin afin de réaliser une analyse de selle
- **Fatigue en rapide dégradation de jour en jour / pâleur** → Contacter le médecin traitant ou le médecin prescripteur pour réaliser une prise de sang afin d'exclure une anémie

En cas d'oubli

- Si vous avez oublié de prendre le comprimé à la bonne heure, prenez le dès que possible et revenez sur l'heure habituelle le lendemain
- En cas d'oubli, ne prenez pas deux doses pour compenser la dose oubliée
- Signalez les oublis à votre médecin lors de la prochaine consultation